

WYMAGANE KONSULTACJE PRZED ZNIECZULENIEM DO PLANOWEGO ZABIEGU OPERACYJNEGO U PACJENTÓW LECZONYCH SPECJALISTYCZNIE

(nie dotyczy zabiegów w trybie natychmiastowym)

1. Konsultacja internistyczna/ pulmonologiczna u chorych z rozpoznaną:

- POCHP
- Astmą oskrzelową
- Gruźlicą

Konsultacja powinna zawierać:

- ✓ rozpoznanie
- ✓ dotychczasowe leczenie
- ✓ ocenę wydolności oddechowej
- ✓ zalecenia modyfikacji leczenia w okresie okołoperacyjnym

2. Konsultacja z zakresu kardiologii u chorych z:

- niewydolnością krążenia
- chorobą wieńcową, po przebytych OZW
- istotną wadą serca
- kardiomiopatią
- nadciśnieniem płucnym
- wszczepionym układem elektrostymulującym
- po zabiegach kardiochirurgicznych

Konsultacja powinna zawierać:

- ✓ rozpoznanie
- ✓ ocenę stopnia zaawansowania niewydolności krążenia
- ✓ wskazania co do konieczności dodatkowej diagnostyki w niestabilnej chorobie wieńcowej
- ✓ w uzasadnionych przypadkach aktualne ECHO serca z oceną frakcji wyrzutowej (istotne klinicznie wady zastawkowe, kardiomiopatie, nadciśnienie płucne, stan po zawale mięśnia sercowego)
- ✓ leczenie z okołoperacyjną modyfikacją terapii, a zwłaszcza modyfikacji leczenia przeciwkrzepliwego i przeciwplatekowego

3. Konsultacja neurologiczna/ lekarza rodzinnego u chorych z:

- po przebytych udarach mózgu
- padaczką
- istotnymi chorobami nerwowo – mięśniowymi
- ciężkimi zespołami korzeniowymi przebiegającymi z ubytkami neurologicznymi

Konsultacja powinna zawierać:

- ✓ rozpoznanie
- ✓ aktualne leczenie
- ✓ ocenę stanu neurologicznego
- ✓ zalecenia okołoperacyjne

- 4. Konsultacja endokrynologiczna** u chorych z: chorobami tarczycy w okresie niewyrównania lub lekarza rodzinnego, jeśli pacjent jest w eutyreozy:

Konsultacja powinna zawierać:

- ✓ rozpoznanie
- ✓ aktualny poziom TSH (z okresu nie dłuższego niż 1 miesiąc wstecz)
- ✓ aktualne leczenie i jego skuteczność
- ✓ modyfikacją leczenia w okresie okołoperacyjnym

- 5. Konsultacja reumatologiczna/ lekarza rodzinnego** u chorych z:

- zespołem chorób reumatoidalnych
- zespołem chorób z autoagresji

Konsultacja powinna zawierać:

- ✓ rozpoznanie
- ✓ leczenie
- ✓ modyfikację leczenia w okresie okołoperacyjnym

- 6. Konsultacja hematologiczna** u chorych z:

- supresją szpiku
- przewlekłą małopłytkowością
- koagulopatią

Konsultacja powinna zawierać:

- ✓ rozpoznanie
- ✓ leczenie (sterydoterapia)
- ✓ modyfikację leczenia okołoperacyjnego

Przy braku stabilizacji schorzeń wymagane są kwalifikacje do planowych zabiegów operacyjnych przez lekarzy specjalistów z danej dziedziny. Dopuszczalne są zaświadczenia o kwalifikacji i braku przeciwwskazań wystawione przez lekarzy rodzinnych dla pacjentów w stanach stabilizacji schorzeń przewlekłych.