



PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII W ZNIECZULENIU

Kolonoskopia – jest metodą endoskopowej oceny jelita grubego. Jest to najlepsze dostępne badanie jelita grubego, umożliwiające jego bezpośrednią i najdokładniejszą ocenę, usunięcie polipów i pobranie wycinków do badania histopatologicznego. Wymaga przygotowania (oczyszczenia) jelita grubego przed badaniem.

Uwagi:

Do zapisu na badanie potrzebne jest skierowanie!!!

1. **Osoby z chorobami wymagającymi stałego regularnego przyjmowania leków (na przykład nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka, astma i inne)** w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody.
2. **Osoby chorujące na cukrzycę** powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania oraz poinformować o chorobie w momencie rejestracji w naszym ośrodku.
3. **Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi** (np. acenocumarol, sintrom, ticlid lub aspiryna, acard, acesan i inne) powinny przerwać ich stosowanie na 5 dni przed badaniem; należy to jednak wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym, konieczna może być zamiana tych leków na heparynę niskocząsteczkową (na przykład Fraxiparyna, Clexane). Informacja o kontynuacji leczenia przeciwkrzepliwego po zabiegu będzie podana po badaniu.
4. Osoby przyjmujące **preparaty żelaza** powinny **na 7 dni przed planowanym badaniem** przerwać przyjmowanie preparatu.
5. **Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią** powinny skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania.
6. Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem **posiadanej dokumentacji medycznej** np. kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych, EKG, echokardiografia oraz aktualnych wyników badań laboratoryjnych takich jak: morfologia, elektrolity, układ krzepnięcia, grupa krwi.
7. Pacjenci powinni znać nazwy i dawki przyjmowanych leków lub posiadać ich spis (wskazane jest zabranie ze sobą tych leków).
8. W bardzo rzadkich przypadkach może zaistnieć konieczność dłuższej obserwacji w oddziale szpitalnym, prosimy uwzględnić to w swoich planach.
9. **Osoby wymagające okularów do czytania** proszone są o zabranie ich ze sobą.
10. **Wyznaczona godzina badania jest orientacyjna i może ulec przesunięciu**, z uwagi na trudny do przewidzenia czas trwania badania.
11. **Na badanie proszę zgłosić się z osobą towarzyszącą (pełnoletnią).**
12. **W dniu badania nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń i maszyn elektrycznych!!!**

SCHEMAT PRZYGOTOWANIA PREPARATEM EZICLEN badanie w znieczuleniu

5 dni przed badaniem nie należy przyjmować leków zawierających żelazo (w tym odżywkę) a 5 dni przed badaniem nie należy spożywać sałatek jarzynowych, owoców, warzyw z pestką i skórką, owoców



pestkowych np. winogrona, pomidory, kiwi, truskawki oraz maku i pieczywa z ziarnami, jogurtów z ziarnami lub owocami, siemienia lnianego. 2-3 dni przed badaniem obowiązuje dieta lekkostrawna.

W dniu poprzedzającym badanie:

Można zjeść lekkostrawne śniadanie, bez mleka, surowych warzyw i owoców oraz napojów gazowanych. Do godziny 15:00 można zjeść lekki obiad w formie zmiksowanej (zupa krem, kisiel, budyń, serek homogenizowany bez dodatków). Inne napoje (klarowne płyny) można pić w dowolnej ilości również do godziny 15:00. Od godziny 15:00 nie można przyjmować żadnych posiłków ani klarowanych płynów.

GODZINA BADANIA	Godzina rozpoczęcia pierwszej dawki leku EZICLEN w przeddzień badania	WYPIJ PIERWSZĄ DAWKĘ W 1,5 GODZINY (2 LITRY)	Godzina rozpoczęcia drugiej dawki leku EZICLEN	WYPIJ DRUGĄ DAWKĘ W 1,5 GODZINY (2 LITRY)
08:00	16:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody	00:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody
09:00	17:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody	01:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody
10:00	17:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody	02:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody
11:00	17:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody	03:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody
12:00	18:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody	04:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody
13:00	18:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody	05:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody
14:00	19:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody	06:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody
15:00	20:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody	07:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody
16:00	20:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody	08:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody
17:00	21:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody	09:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody
18:00	22:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody	10:00	0,5 litra roztworu + minimum 1,5 litra wody

Pierwsza dawka EZICLEN o określonej godzinie (patrz tabela) – włączyć jedną butelkę roztworu EZICLEN do dołączonego kubka, który znajduje się w opakowaniu, następnie dolać wody niegazowanej do podziałki, która znajduje się na kubku (razem będzie 0,5 litra) POWOLI wypić. Po wypiciu roztworu z lekiem należy wypić dodatkowo 1,5 litra przejrzystego płynu (w ciągu 1,5 godziny).

Druga dawka EZICLEN - włączyć drugą butelkę roztworu EZICLEN do dołączonego kubka, który znajduje się w opakowaniu, następnie dolać wody niegazowanej do podziałki, która znajduje się na kubku (razem będzie 0,5 litra) wypić. Po wypiciu roztworu z lekiem należy wypić dodatkowo 1,5 litra przejrzystego płynu (w ciągu 1,5 godziny)

Picie preparatu należy zakończyć 6 godzin przed badaniem !!!!!!!